明益欣®

OTC 外

丁酸氢化可的松乳膏说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：丁酸氢化可的松乳膏

英文名称：Hydrocortisone Butyrate Cream

汉语拼音：Dingsuan Qinghua Kedisong Rugao

[成　　份] 本品每克含丁酸氢化可的松1毫克。辅料为：白凡士林、十六醇、轻质液状石蜡、脂肪醇聚氧乙烯醚、鲸蜡硬脂基葡糖苷、羟苯乙酯、丙二醇、枸橼酸、枸橼酸钠。

[性　　状] 本品为白色乳膏

[作用类别] 本品为皮肤科用药类非处方药药品。

[适 应 症] 用于过敏性皮炎、脂溢性皮炎、过敏性湿疹及苔藓样瘙痒症等。

[规　　格] 10g：10mg

[用法用量] 局部外用。取适量本品涂于患处，一日2次。

[不良反应] 长期使用可致皮肤萎缩、毛细血管扩张、色素沉着及继发感染。偶见过敏反应。

[禁　　忌] 感染性皮肤病禁用。

[注意事项] 1、儿童、孕妇和哺乳期妇女应在医师指导下使用。

2、不得用于皮肤破溃处。

3、避免接触眼睛和其他黏膜（如口、鼻等）。

4、用药部位如有烧灼感、红肿等情况应停药，并将局部药物洗净，必要时向医师咨询。

5、不宜大面积、长期使用；用药1周后症状未缓解，请咨询医师。

6、对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7、本品性状发生改变时禁止使用。

8、请将本品放在儿童不能接触的地方。

9、儿童必须在成人监护下使用。

10、如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

11、运动员慎用。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[药理作用]本品为糖皮质激素类药物，外用具有抗炎、抗过敏、止痒及减少渗出作用。

[贮　　藏]避光，密闭，在阴凉处(不超过20℃)保存。

[包　　装]铝质药用软膏管，10g/支，20g/支。

[有 效 期]24个月

[执行标准]《中国药典》2025年版二部

[批准文号]国药准字H20074168

[说明书修订日期]2025年10月01日

[药品上市许可持有人]四川明欣药业有限责任公司

[药品上市许可持有人地址]成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园青啤大道1069号

[委托企业]

企业名称：四川明欣药业有限责任公司

注册地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园青啤大道1069号

邮政编码：611130

电话号码：028-82762664

传真号码：028-82762685

网　　址：http://www.scmx.cn

[受托企业]

企业名称：重庆华邦制药有限公司

生产地址：重庆市北碚区京东方大道255号

如有问题可与生产企业联系