核准日期：2006年12月20日
修改日期：2025年08月01日

盐酸伐昔洛韦颗粒说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名：盐酸伐昔洛韦颗粒

商品名：明竹欣


英文名：Valacyclovir Hydrochloride Granules

汉语拼音：Yansuan Faxiluowei Keli

【成　　份】本品主要成份为盐酸伐昔洛韦。

化学名称：2-[(6-氧代-2-氨基-1，6-二氢-9H-嘌呤-9-基)甲基氧基]乙基L-缬氨酸酯盐酸盐

化学结构式：



分子式：$C_{13}H_{20}N_6O_4 \cdot HCl$

分子量：360.80

【性　　状】本品为白色或类白色可溶颗粒，味酸甜。

【适 应 症】用于治疗水痘带状疱疹及I型、II型单纯疱疹的感染，包括初发和复发的生殖器疱疹。

【规　　格】150mg

【用法用量】口服，一日二次，成人每次0.3g，饭前空腹服用。带状疱疹连续服药10天。单纯疱疹连续服药7天。

【不良反应】偶有轻度胃部不适，头晕等。

【禁　　忌】对本品及阿昔洛韦过敏者及孕妇禁用。

【注意事项】肾功能不全者及哺乳期妇女慎用。本品对二岁以下儿童的安全性、有效性资料尚未建立。服药期间宜多饮水。

【孕妇及哺乳期妇女用药】孕妇禁用，哺乳期妇女慎用。

【儿童用药】本品对二岁以下儿童的安全性、有效性资料尚未建立。

【老年用药】本品对老年患者的安全性、有效性资料尚未建立。

【药物相互作用】尚不明确。

【药物过量】尚不明确。

【药理毒理】本品是阿昔洛韦的前体，进入体内水解成阿昔洛韦而抑制病毒。对单纯疱疹病毒Ⅰ(HSV-Ⅰ)和单纯疱疹病毒Ⅱ(HSV-Ⅱ)的抑制作用强，对水痘疱疹病毒、EB病毒及巨细胞病毒的抑制作用弱。其作用机制是限制病毒DNA的合成而抑制其复制。

【药代动力学】盐酸伐昔洛韦颗粒600mg口服后被迅速吸收并转化为阿昔洛韦，血液中阿昔洛韦达峰时间为1.90±0.21小时，峰浓度约为3.18±0.88μg/ml，本颗粒剂相对于盐酸伐昔洛韦片的人体生物利用度为105.6%±9.83%。盐酸伐昔洛韦口服吸收后分布广泛，可分布到所有14个组织中，其中胃、小肠、肾、肝、淋巴结和皮肤组织中浓度最高，脑组织的浓度最低。盐酸伐昔洛韦口服吸收后在体内被迅速完全转化为阿昔洛韦，代谢产物主要从尿中排除，其中阿昔洛韦占46%-59%，8-羟基-9-鸟嘌呤占25%-30%，9-羟基甲氧基甲基鸟嘌呤占11%-12%。口服给药后阿昔洛韦的消除为单相，半衰期为1.91±0.49小时。

【贮　　藏】 密封，在干燥处保存。

【包　　装】 药品包装用复合膜，150mg/包，6包/小盒，12包/小盒。

【有 效 期】 24个月

【执行标准】 WS_1-(X-146)-2004Z

【批准文号】 国药准字H20010451

【上市许可持有人】四川明欣药业有限责任公司

【上市许可持有人地址】成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园青啤大道1069号

【生产企业】

企业名称：四川明欣药业有限责任公司

生产地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园青啤大道1069号

邮政编码：611130

电话号码：028-82762664

传真号码：028-82762685

网　　址：Http://www.scmx.cn