
核准日期：2007年01月31日
修改日期：2025年08月01日

盐酸伐昔洛韦胶囊说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】
通用名：盐酸伐昔洛韦胶囊
商品名：明竹欣
英文名：Valacyclovir Hydrochloride Capsules
汉语拼音：Yansuan Faxiluowei Jiaonang
【成　　份】本品主要成份为盐酸伐昔洛韦。
化学名称：2-[(6-氧代-2-氨基-1，6-二氢-9H-嘌呤-9-基)甲基氧基]乙基L-缬氨酸酯盐酸盐
化学结构式：



分子式：$C_{13}H_{20}N_6O_4 \cdot HCl$
分子量：360.80
【性　　状】本品内容物为白色或类白色粉末。
【适 应 症】用于治疗水痘带状疱疹及Ⅰ型、Ⅱ型单纯疱疹的感染，包括初发和复发的生殖器疱疹。本品在医生的指导下，可用于阿昔洛韦的所有适应症。
【规　　格】0.15g
【用法用量】口服，一日2次，一次0.3g，饭前空腹服用。带状疱疹连续服药10天。单纯疱疹连续服药7天。
【不良反应】偶有轻度胃部不适，头晕等。
【禁　　忌】对本品及阿昔洛韦过敏者禁用。
【注意事项】1.肾功能不全者慎用。　2.服药期间宜多饮水。
【孕妇及哺乳期妇女用药】1.孕妇禁用。　2.哺乳期妇女慎用。
【儿童用药】儿童慎用，本品对二岁以下的儿童的安全性、有效性资料尚未建立。
【老年用药】本品对老年患者的安全性、有效性资料尚未建立。
【药物相互作用】尚不明确。

【药物过量】尚不明确。

【药理毒理】

1.药理：盐酸伐昔洛韦是阿昔洛韦的前体药物，口服后吸收迅速并在体内很快转化为阿昔洛韦，其抗病毒作用为母体阿昔洛韦的作用所致，阿昔洛韦进入疱疹感染细胞之后，与脱氧核苷竞争病毒胸腺嘧啶激酶或细胞激酶，药物被磷酸化成活化型无环鸟苷三磷酸酯，作为病毒DNA复制的底物与脱氧鸟嘌呤三磷酸酯竞争病毒DNA聚合酶，从而抑制了病毒DNA合成，显示抗病毒效力。本品对单纯性疱疹病毒Ⅰ型和Ⅱ型及水痘带状疱疹病毒有很高的疗效，对哺乳动物宿主细胞毒性很低。盐酸伐昔洛韦口服生物利用度高，故体内抗病毒活性优于阿昔洛韦，对单纯疱疹病毒Ⅰ型和Ⅱ型的治疗指数分别比阿昔洛韦高42.91%和30.13%。

2.毒理：盐酸伐昔洛韦大、小鼠灌胃给药的半数致死量（LD_{50}）分别为4.4g/kg和1.51g/kg，高于临床给药剂量数百倍。由于盐酸伐昔洛韦在体内很快转化为阿昔洛韦，其代谢产物在体内没有蓄积现象，因此，当调整与阿昔洛韦相同血药浓度水平时，在不同阶段的慢性和亚慢性试验中，盐酸伐昔洛韦与阿昔洛韦具有相同的安全性。在临床剂量范围内，盐酸伐昔洛韦是很安全的。

【药代动力学】

盐酸伐昔洛韦胶囊600mg口服后被迅速吸收并转化为阿昔洛韦，血中母体阿昔洛韦达峰时间为2.35±0.24小时。阿昔洛韦血药峰浓度约为2.59±0.82μg/ml，本胶囊剂相对于盐酸伐昔洛韦片的人体生物利用度为103.6±11.2%。盐酸伐昔洛韦口服吸收后在体内分布广泛，可分布到所有组织中，其中胃、小肠、肾、肝、淋巴结和皮肤组织中浓度最高，脑组织中的浓度最低。

盐酸伐昔洛韦口服吸收后在体内被迅速彻底地转化为阿昔洛韦，代谢产物主要从尿中排除，其中阿昔洛韦占46%～59%，8-羟基-9-鸟嘌呤占25%～30%，9-羟基甲氧基甲基鸟嘌呤占11%～12%。口服给药后母体阿昔洛韦的消除为单相，半衰期为2.86±0.39小时。

【贮　　藏】密封，在干燥处保存。

【包　　装】药品包装用铝箔/药用PVC硬片，6粒/板，1板/小盒。

【有 效 期】24个月

【执行标准】《中国药典》2025年版二部

【批准文号】国药准字H10970071

【上市许可持有人】四川明欣药业有限责任公司

【上市许可持有人地址】成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园青啤大道1069号

【生产企业】

企业名称：四川明欣药业有限责任公司

生产地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园青啤大道1069号

邮政编码：611130

电话号码：028-82762664

传真号码：028-82762685

网　　址：Http://www.scmx.cn