核准日期：2021年02月26日
修订日期：2025年07月03日

外 OTC

过氧苯甲酰凝胶说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】
通用名称：过氧苯甲酰凝胶
英文名称：Benzoyl Peroxide Gel
汉语拼音：Guoyangbenjiaxian Ningjiao
【成　　份】本品每克含过氧苯甲酰50毫克，辅料为：多库酯钠、依地酸二钠、卡波姆均聚物、丙二醇、泊洛沙姆188、丙烯酸酯共聚物、甘油、胶态二氧化硅、氢氧化钠、纯化水。
【性　　状】本品为白色均匀乳脂样凝胶。
【作用类别】本品为皮肤科用药类非处方药药品。
【适 应 症】本品适用于寻常痤疮的外用治疗。
【规　　格】5%（15g：0.75g）
【用法用量】洗净患处，轻轻揩干，取适量本品涂于患处，一日1-2次。
【不良反应】可引起接触性皮炎、皮肤烧灼感、瘙痒、发红、肿胀、皮肤干燥、脱屑等。罕见面部肿胀，皮疹，光过敏，皮肤疼痛(螫刺感)，过敏性皮炎等。
【禁　　忌】**1.对本品任何成份有过敏者禁用。**
2.皮肤有急性炎症和破溃者（创面、皮肤糜烂或急性皮肤炎症）禁用。
【注意事项】
1.本品只能外用。
2.不要涂抹于已受到既往治疗影响或晒伤的皮肤处。
3.避免接触眼睛和其他黏膜（如口、鼻等）。如果制剂进入眼睛、用水彻底清洗。在对脖子和其他敏感部位用药时应小心。
4.孕妇避免使用，哺乳期妇女慎用，不得将本品用于哺乳期妇女胸部。
5.儿童应用本品的安全有效性尚未确立，儿童用药需由医生权衡利弊后谨慎使用。
6.用药部位如有烧灼感、红肿等情况，出现严重结痂、红斑和水肿应停药，并将局部药物洗净，必要时向医师咨询。
7.本品含有丙二醇，可能引起皮肤刺激。
8.初次用药时可能会感到轻微的灼烧感，出现皮肤变红和脱皮。在治疗的最初几周，大多数患者会出现脱皮突然增加。这属于正常现象，如果暂停治疗，通常会在一两天内消退。应通过在一小块皮肤上重复试用，测定个体敏感性。如果出现严重刺激性，患者应降低使用频率，直至停止使用。
9.药物过量可能会引起严重刺激性，应停止使用本品。
10.可能会引起皮肤肿胀和起泡。出现该症状时应停止治疗。
11.应避免过度暴露于阳光或紫外线下。
12.避免接触毛发和织物，以免脱色。
13.对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
14.本品性状发生改变时禁止使用。
15.请将本品放在儿童不能接触的地方。
16.儿童必须在成人监护下使用。
17.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】
1.本品与肥皂、清洁剂、痤疮制剂如含有过氧苯甲酰、雷锁辛、硫磺、维A酸等，或含有酒精的制剂，药用化妆品等同用，会增加刺激或干燥作用。
2.如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。
【药理作用】本品是一种氧化剂，外用于皮肤后，能缓慢释放出新生态氧，可杀灭痤疮丙酸杆菌，并有使皮肤干燥和脱屑作用。
【贮　　藏】密封，在25℃以下保存。
【包　　装】药用聚乙烯/铝/聚乙烯复合软膏管，15g/支，30g/支，50g/支。
【有 效 期】24个月
【执行标准】国家药品监督管理局标准YBH02662021
【批准文号】国药准字H20063377
【上市许可持有人】
名称：四川明欣药业有限责任公司
地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园青啤大道1069号
【生产企业】
企业名称：四川明欣药业有限责任公司
生产地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园青啤大道1069号
邮政编码：611130
电话号码：(028)82762664
传真号码：(028)82762685
网　　址：Http://www.scmx.cn/

如有问题可与生产企业联系